

特性一覧 --メロン

[◎:特に優れる ○:優れる △:普通]

品種名	ネット		果皮色	果形	果重	肉色	糖度	熟期 (開花後)	草勢	抵抗性	
	密度	盛上がり								ウドンコ病	ツルワレ病 レース0・2
F ¹ ルピアレッド	密	良	灰緑	正球	1.5kg	オレンジ	15度以上	55日	中	○	◎
F ¹ サマールピアレッド	密	良	灰緑	正球	1.5kg	オレンジ	16度以上	53日	やや強	○	◎
F ¹ ビューレッド	やや密	良	灰緑	やや腰高	1.5kg	オレンジ	15度以上	55日	やや強	△	◎
F ¹ 天恵	密	良	灰緑	やや腰高	1.5kg	緑	15度以上	55日	やや強	○	◎
F ¹ アブリオ	やや密	良	灰緑	正球	1.5kg	緑	17度以上	55日	中	○	◎
F ¹ スカイグリーン	密	良	灰緑	正球	1.5kg	緑	15度以上	55日	強	○	◎
F ¹ エリザベス239	-	-	橙黄	やや腰高	700g	白	15度内外	40日	中	-	-
F ¹ エリザベスFR	-	-	橙黄	やや腰高	700g	白	15度内外	42日	中	-	◎
F ¹ エリザベスII	-	-	橙黄	やや腰高	900g	白	15度内外	42日	中	-	-
F ¹ レイソル	-	-	黄金	腰高	800g	白	16度以上	42日	やや弱	-	-